


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SC Ortopedia Traumatologia e Chirurgia Protetica e dei reimpianti d'anca e di ginocchio (Prof. Francesco Traina)

Direttore Prof. Francesco Traina

via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Tel.: 051/6366418/821 - Fax 0516366416

EQUIPE: DR. FEDERICO BIONDI, DR. GIOVANNI BRACCI, DR. LUCA BUSANELLI, DR. PIERINA PAOLA CALDERONI, DR. FRANCESCO CASTAGNINI, DR. MICHELE DI LIDDO, DR. FEDERICO GIARDINA, DR. CLAUDIO MASETTI, DR. MAURIZIO MONTALTI, DR. FRANCESCO PERDISA, DR. ENRICO TASSINARI, DR. GIUSEPPE TELLA

Paziente: **VEGHES ELENA EUGENIA**, data di nascita: **01-08-1968**
ricovero dal **09-12-2019** al **16-12-2019**

Egregio Collega,

dimettiamo in data odierna la sua assistita, ricoverata nel nostro reparto per esiti espianto protesi ginocchio sinistro. Durante il ricovero la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di revisione protesi ginocchio sinistro previa estemporanea (negativa per infezione) in data 10/12/2019. Il decorso post-operatorio è stato regolare e le ferite sono in ordine. Si è impostata terapia antibiotica come da consulenza infettivologica (Minociclina e Rifampicina), sospesi ind ata 16-12. Si segnala modesta anemia, clinicamente ben tollerata e con valori in risalita, per cui si consigliano controlli evolutivi; si segnalano altresì alterazioni degli esami di funzionalità epatica, da rivalutazione evolutivamente. Durante il ricovero la paziente ha iniziato il programma riabilitativo ed è in grado di flettere il ginocchio fino a 90° e di salire e scendere le scale con 2 bastoni antibrachiali.

Consigliamo:

- Deambulazione con carico parziale sull'arto operato con 2 bastoni antibrachiali per 15 giorni quindi carico progressivo con cautela sull'arto operato mantenendo comunque i due bastoni antibrachiali;
- Rinnovo della medicazione ogni 3-4 giorni e rimozione dei punti di sutura a circa 15 giorni dall'intervento, a cicatrizzazione avvenuta; qualora si riscontrassero ritardi o problemi di guarigione della ferita, contattare subito i medici di reparto;
- Proseguimento della terapia riabilitativa mediante mobilizzazione attiva e passiva del ginocchio ed esercizi di statica e deambulazione assistita.
- Controllo P.A. e temperatura corporea quotidiano, emocromo (con conta piastrinica) e coagulazione fra qualche giorno e poi settimanalmente con visione da parte del Curante.
- Controllo della funzionalità epatica da ripetere tra 3 giorni e far visionare al Curante, sospendendo tutti i farmaci epatotossici.
- Controllo settimanale della PCR per 4-6 settimane da portare in visione al Curante e da inviare presso info@ausl.bo.it

Terapia medica da proseguire sotto lo stretto controllo del Curante:

- Enoxaparina 4000 UI (Inhixa) 1 fl sottocute al giorno (ore 23) fino al prossimo controllo e comunque fino a concessione del carico completo
- Terapia antidolorifica al bisogno: Ketorolac 80 1 bustina per massimo 2 volte al giorno
- Terapia marziale per 15 giorni: Calcio folinato 1 cp ore 14, solfato ferroso 1 cp ore 12 e 18
- Eventuale rientro a Salazopirina sotto controllo del Curante

Rivedremo la paziente a controllo ambulatoriale fra circa 30 giorni come da allegato (se possibile con rx del ginocchio operato in 2 pose eseguite qualche giorno prima) oppure prenotando al 800046040 per visita in regime L.P.. Prognosi 35 gg.

All'attenzione del medico di base: si ricordi di fornirci immediata comunicazione se eventualmente dovessero insorgere complicazioni importanti quali infezioni del loco chirurgico, flebite o tromboflebite dell'arto operato o del contro laterale con eventuale embolia polmonare, contattando immediatamente il numero 051-6366418/821/148

oppure tramite fax al numero 051-6366416.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bologna, li ~~16~~-12-2019

Il medico di reparto

DR. FRANCESCO CASTAGNINI

